

医師による登園許可書が必要な感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|----------------------------|--|--|
| 麻疹（はしか） | 発症 1 日前から発疹出現の 4 日後まで | 解熱後 3 日を経過していること |
| インフルエンザ | 症状がある期間（発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い） | 発症したのち 5 日経過し、かつ解熱したあと 3 日経過していること。 |
| 風疹 | 発疹出現の 7 日前から 7 日後くらいまで | 発疹が消失していること |
| 水痘（水ぼうそう） | 発疹出現 1～2 日前から痂皮（かさぶた）形成まで | 全ての発疹が痂皮（かさぶた）化していること |
| 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | 発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
| 結核 | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 咽頭結膜熱（プール熱） | 発熱、充血等の症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後 2 日経過していること |
| 流行性角結膜炎 | 充血、目やに等の症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失していること |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで | 特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による 5 日間の治療が終了していること |
| 腸管出血性大腸菌感染症（o157.o26.o111） | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること。 （無症状病原体保有者の場合、2 回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。） |
| 急性出血性結膜炎 | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること。 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること。 |

医師の診断を受け保護者による登園届が必要な感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 溶連菌感染症 | 適切な抗菌治療を開始する前と開始後 1 日間 | 抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること |
| マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳がおさまっていること |
| 手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発生した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| 伝染性紅斑（りんご病） | 発疹出現前の 1 週間 | 全身状態が良いこと |
| ウイルス性胃腸炎 （ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス等） | 症状のある間と、小上昇日後 1 週間（量は減少していくが数週間ウイルスを輩出しているので注意が必要） | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
| ヘルパンギーナ | 急性期の数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍等の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RS ウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
| 帯状疱疹 | 水疱を形成している間 | 全ての発疹が痂皮（かさぶた）化していること |
| 突発性発疹 | — | 解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと |